

Теория функций, функциональный
анализ и их приложения. 1966 г. вып 2
стр 128-130

НЕЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРНЫЕ БАЗИСЫ В ПРОСТРАНСТВЕ БАНАХА

М. И. Кадец

Пусть

$$x_1, x_2, x_3, \dots \quad (1)$$

полная минимальная система в сепарабельном пространстве Банаха X . Сопряженную к ней систему линейных функционалов обозначим

$$f_1, f_2, f_3, \dots (f_i \in X^*; f_i(x_j) = \delta_{ij}). \quad (2)$$

Каждому элементу $x \in X$ можно сопоставить разложение по биортогональной системе (1 — 2):

$$x \sim \sum_{i=1}^{\infty} f_i(x) x_i. \quad (3)$$

Ряд (3), вообще говоря, расходится. Обозначим:

X_n — линейная оболочка элементов $\{x_i\}_1^n$;

X_n^{σ} — замыкание линейной оболочки элементов $\{x_i\}_{n+1}^{\infty}$;

X_n^{σ} — линейная оболочка элементов $\{x_i\}_{n+1}^{\infty}$;

$S_n x = \sum_{i=1}^n f_i(x) \cdot x_i$ — частная сумма ряда (3).

Задача восстановления элемента по частным суммам его разложения (3) состоит в следующем: нужно построить последовательность непрерывных операторов T_n , каждый из которых определен в соответствующем X_n , таких, что для каждого $x \in X$

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n S_n x.$$

Если операторы T_n линейны, то система (1) называется операторным базисом [1]; в противном случае назовем систему (1) нелинейным операторным базисом. Отметим одно свойство операторных базисов, доказанное в [1]:

Предложение 1. *Линейная оболочка Γ системы линейных функционалов, сопряженной операторному базису, есть нормирующее множество.*

Множество линейных функционалов мы называем нормирующим, если

$$\inf_{x \in X} \sup_{f \in \Gamma} \frac{|f(x)|}{\|f\| \cdot \|x\|} > 0.$$

До сих пор неизвестно, в каждом ли сепарабельном пространстве Банаха X существует операторный базис. Более того, неизвестно даже,

существует ли последовательность линейных конечномерных (или хотя бы вполне непрерывных) операторов U_n , таких, что для каждого $x \in X$

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n x.$$

Поэтому может представлять интерес следующая теорема, доказательству которой посвящена настоящая заметка.

Теорема. Если полная минимальная система $\{x_i\}_1^\infty$ такова, что линейная оболочка Γ ее сопряженной системы $\{f_i\}_1^\infty$ есть нормирующее множество, то $\{x_i\}_1^\infty$ — операторный базис (вообще говоря, нелинейный).

Идея доказательства такова. Расходимость ряда (3) обычно связана с ростом норм частных сумм $S_n x$ при $n \rightarrow \infty$. Поэтому следует попытаться для каждой частной суммы $S_n x \in X_n$ найти в X^n элемент $z = R_n S_n x$ такой, что

$$\|S_n x + R_n S_n x\| = \inf_{z \in X^n} \|S_n x + z\| \leq \|x\|,$$

и проверить, не сходится ли последовательность $T_n S_n x = S_n x + R_n S_n x$ к элементу x . В чистом виде эта идея проходит, например, для равномерно выпуклых пространств. Вообще же она нуждается в существенных коррективах.

Лемма. Для каждого n и $\epsilon > 0$ найдется такое $N = N(n, \epsilon)$, что

$$\min_{z \in X_N^n} \|y + z\| \leq (1 + \epsilon) \inf_{z \in X^n} \|y + z\| \quad (4)$$

для всех $y \in X_n$.

Доказательство. Функции

$$h_n^{(N)}(y) = \min_{z \in X_N^n} \|y + z\|; \quad h_n(y) = \inf_{z \in X^n} \|y + z\| \quad (y \in X_n)$$

непрерывны и удовлетворяют условиям

$$h_n^{(n+1)}(y) \geq h_n^{(n+2)}(y) \geq \dots \geq h_n(y); \quad \lim_{N \rightarrow \infty} h_n^{(N)}(y) = h_n(y). \quad (5)$$

Согласно известной теореме Дини, сходимость в (5) равномерна на единичной сфере подпространства X_n , откуда и следует существование $N(n, \epsilon)$ для нормированных $y \in X_n$. Так как неравенство (4) однородно относительно y , то оно справедливо для всех $y \in X_n$.

Предложение 2. Пусть X сепарабельное пространство Банаха; $\Gamma \subset X^*$ нормирующее множество, являющееся линейной оболочкой счетного множества линейных функционалов $\{f_i\}_1^\infty$. Тогда в X можно ввести эквивалентную норму, обладающую следующими свойствами: относительно этой нормы пространство становится строго нормированным; если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x) \quad \text{для всех } f \in \Gamma,$$

то

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \geq \|x\|;$$

если сверх того

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\|,$$

то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0.$$

Доказательство. Эквивалентная норма, обладающая всеми свойствами, кроме первого, построена в [2]; обозначим ее $\|\cdot\|_0$. Искомая норма строится так:

$$\|x\| = \sqrt{\|x\|_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|f_k(x)|^2}{2^k \|f_k\|_0^2}}$$

Сравнительно просто доказывается, что эта норма сохраняет все требуемые свойства нормы ($\|\cdot\|_0$) и, кроме того, делает пространство строго нормированным (и даже локально равномерно выпуклым [3]).

Доказательство теоремы. Итак, пусть X — сепарабельное пространство Банаха; $\{x_i\}_1^{\infty}$ — полная минимальная система, $\{f_i\}_1^{\infty}$ — сопряженная система, причем ее линейная оболочка Γ — нормирующее множество. Требуемые операторы T_n ($n = 1, 2, \dots$) строятся так. В X вводим эквивалентную норму, удовлетворяющую требованиям предложения 2 относительно Γ (обозначим ее $\|\cdot\|$). Для каждого n определяем по лемме число $N = N\left(n, \frac{1}{n}\right)$. Если теперь $y \in X_n$, то элемент $T_n y$ определяется единственным образом из условий:

$$T_n y - y \in X_N^n; \quad \|T_n y\| = \min_{z \in X_N^n} \|y + z\| \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Докажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n S_n x = x$ для всех $x \in X$.

Заметим прежде всего, что

$$f_\nu(T_n S_n x) = f_\nu(S_n x) = f_\nu(x); \quad (\nu = 1, 2, \dots) \quad \{1 \leq \nu \leq N\}$$

и, значит,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(T_n S_n x) = f(x) \quad \text{для всех } f \in \Gamma. \quad (6)$$

Из предложения 2 получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n S_n x\| \leq \|x\|. \quad (7)$$

С другой стороны, по лемме

$$\|T_n S_n x\| \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) \inf_{z \in X_N^n} \|S_n x + z\| \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) \|x\|. \quad (8)$$

Сопоставляя (7) и (8), имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n S_n x\| = \|x\|. \quad (9)$$

Из (6) и (9), согласно предложению 2, следует

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n S_n x - x\| = 0,$$

что и требовалось доказать.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. Ф. Гапошкин, М. И. Кадец. Операторные базисы в пространствах Банаха. «Матем. сб.», т. 61 (103): 1, 3—12, 1963.
2. М. И. Кадец. Про зв'язок між слабою та сильною збіжністю. «Доповіді АН УРСР», № 9, 949—952, 1959.
3. М. И. Кадец. Письмо в редакцию. «Изв. вузов. Математика», № 6, 186—187, 1961.

Замечание: T_n наследует из X_n в X .

Можно уточнить конструкцию
так, чтобы T_n наследовал из X_n в X_n

А так, чтобы T_n был гомеоморфизмом?