

ЧЕБЫШЕВСКИЕ ЦЕНТРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ $C[a, b]$ *В. Н. Замятин, М. И. Кадец*

Пусть X — банахово пространство; V — его ограниченное подмножество. Рассмотрим множество всех замкнутых шаров, содержащих V :

$$V \subset U(r, x); U(r, x) = \{z : \|x - z\| \leq r\}.$$

Нижняя грань радиусов этих шаров называется чебышевским радиусом и обозначается r_V . Если существует шар радиуса r_V , содержащий V , то его центр x_V называется чебышевским центром множества V .

А. Л. Гаркави [1] показал, что если B -пространство ортогонально дополняемо в своем втором сопряженном, то каждое ограниченное множество $V \subset X$ имеет чебышевский центр. Пространствами этого типа являются, например, пространство L и все сопряженные B -пространства. В [1] приведен также пример B -пространства, в котором даже не каждое компактное множество имеет чебышевский центр.

Чебышевский центр, вообще говоря, не единственен. Совокупность чебышевских центров множества V будем обозначать T_V . Множество T_V — ограниченное, замкнутое, выпуклое. Если пространство X равномерно выпуклое в каждом направлении, то для каждого V множество T_V состоит не более чем из одной точки [1].

Пусть T — множество чебышевских центров множества V . Если для любой последовательности множеств V_n , сходящейся к V в смысле Хаусдорфа [2, стр. 167], последовательность множеств чебышевских центров T_n сходится к T , то говорят, что T сильно устойчиво [3].

П. К. Белобров [3] показал, что в равномерно выпуклом пространстве чебышевский центр любого ограниченного множества сильно устойчив. В [3] также приведен пример, который показывает, что даже в конечномерном пространстве множество чебышевских центров может оказаться неустойчивым.

В этой заметке мы установим существование чебышевских центров для каждого ограниченного подмножества V пространства $C[a, b]$, а также устойчивость множеств T_V .

Пусть V — ограниченное множество пространства $C[a, b]$. Рассмотрим две функции

$$m(t) = \inf_{x \in V} x(t); M(t) = \sup_{x \in V} x(t)$$

и с их помощью определим необходимые для дальнейшего функции

$$n(t) = \lim_{\tau \rightarrow t} m(\tau); N(t) = \lim_{\tau \rightarrow t} M(\tau).$$

Очевидно, функции $M(t)$ и $n(t)$ полунепрерывны снизу, а $N(t)$ и $m(t)$ — сверху: для любого $x \in V$ справедливо неравенство

$$n(t) \leq x(t) \leq N(t) \quad (a \leq t \leq b). \quad (1)$$

Рассмотрим разность $N(t) - n(t)$. Так как она полунепрерывна сверху, то существует точка $t_0 \in [a, b]$, в которой эта разность достигает наибольшего значения:

$$\max_t \{N(t) - n(t)\} = N(t_0) - n(t_0) = 2r \geq 0. \quad (2)$$

Лемма 1. Для любой функции $z(t) \in C[a, b]$

$$\sup_{x \in V} \|x - z\| \geq r, \quad (3)$$

где r определено равенством (2).

Доказательство. Задавшись $\varepsilon > 0$, рассмотрим окрестность $(t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ точки t_0 , столь малую, что колебание функции $z(t)$ в ней меньше, чем $\varepsilon/2$. Согласно (2),

$$N(t_0) - z(t_0) \geq r, \text{ или } z(t_0) - n(t_0) \geq r. \quad (4)$$

Допустим, не ограничивая общности, что выполнено первое из неравенств (4). Так как функция $M(t)$ полунепрерывна снизу, то из определения функции $N(t)$ получается, что в любой окрестности произвольной точки графика функции $N(t)$ найдется точка графика $M(t)$ и, следовательно, точка графика одной из функций $x(t) \in V$. Значит, найдутся функция $x(t) \in V$ и точка $t_1 \in [a, b]$ такие, что

$$|t_1 - t_0| < \delta \quad |x(t_1) - N(t_0)| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (5)$$

Так как, кроме того,

$$|z(t_1) - z(t_0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad (6)$$

то из (4), (5) и (6) получаем

$$x(t_1) - z(t_1) \geq r - \varepsilon.$$

Ввиду произвольности $\varepsilon > 0$ отсюда вытекает (3).

Теорема 1. Каждое ограниченное множество V в $C[a, b]$ имеет чебышевский центр. Совокупность T всех чебышевских центров множества V состоит из тех и только тех непрерывных функций $y(t)$, которые удовлетворяют неравенству

$$N(t) - r \leq y(t) \leq n(t) + r. \quad (7)$$

Чебышевский радиус r_V равен r .

Доказательство. Так как функции $N(t) - r$ и $n(t) + r$ полунепрерывны сверху и снизу соответственно, то по теореме об отделении полунепрерывных функций с помощью непрерывных (см. [2., стр. 356]) существует непрерывная функция $y(t)$, удовлетворяющая (7). Вычитая (7) из (1), получим

$$-r \leq x(t) - y(t) \leq r,$$

откуда $\|x - y\| \leq r$ для любого $x(t) \in V$. Сопоставляя (3) с последним неравенством, убеждаемся в том, что r является чебышевским радиусом множества V , а каждая непрерывная функция $y(t)$, удовлетворяющая (7), — его чебышевским центром. Пусть теперь дано, что $y_0(t)$ — чебышевский центр множества V . Это означает, что

$$x(\tau) - r \leq y_0(\tau) \leq x(\tau) + r.$$

Так как $y_0(\tau)$ фиксирована, то в правой части можно перейти к нижней, в левой — к верхней грани по всем $x(\tau) \in V$.

$$M(\tau) - r \leq y_0(\tau) \leq m(\tau) + r.$$

Благодаря непрерывности $y_0(r)$ можно совершить следующий предельный переход:

$$\overline{\lim}_{\tau \rightarrow t} M(\tau) - r \leq \lim_{\tau \rightarrow t} y_0(\tau) \leq \underline{\lim}_{\tau \rightarrow t} m(\tau) + r$$

и получить, таким образом, неравенство (7). Теорема доказана полностью.

Пример. Рассмотрим множество V всех непрерывных функций заданных на отрезке $[-1, 1]$ и обладающих следующими свойствами:

- 1) $\|x\| \leq 1$;
 - 2) $x(t) > 0$ при $t > 0$;
 - 3) $x(t) < 0$ при $t < 0$;
 - 4) $x(0) = 0$.
- Очевидно,

$$M(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t \leq 0 \\ 1 & \text{при } t > 0 \end{cases}; \quad m(t) = \begin{cases} -1 & \text{при } t < 0 \\ 0 & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Тогда

$$N(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t \leq 0 \\ 1 & \text{при } t > 0 \end{cases}; \quad n(t) = \begin{cases} -1 & \text{при } t \leq 0 \\ 0 & \text{при } t > 0 \end{cases}$$

а чебышевский радиус r_V равен 2. Так как функция $n(t) + r_V$ совпадает с $M(t)$, а $N(t) - r_V$ с $m(t)$, то из теоремы получается, что совокупность чебышевских центров множества V совпадает с самим множеством V .

Следующая лемма является некоторым усилением теоремы об отделении полунепрерывных функций.

Лемма 2. Пусть на $[a, b]$ даны две функции $u(t)$ и $v(t)$, причем $u(t)$ полунепрерывна сверху, а $v(t)$ — снизу, и $u(t) \leq v(t)$. Если $u(t)$ не обращается в $+\infty$, а $v(t)$ в $-\infty$, то какова бы ни была точка t_0 из $[a, b]$ можно найти непрерывные функции $y_1(t)$ и $y_2(t)$, что

$$u(t) \leq y_i(t) \leq v(t); \quad (i = 1, 2); \quad y_1(t_0) = v(t_0); \quad y_2(t_0) = u(t_0).$$

Доказательство. Если изменить значение полунепрерывной функции только в одной точке, то это не повлияет на характер её полунепрерывности. Поэтому функция

$$u_1(t) = \begin{cases} u(t) & \text{при } t \neq t_0 \\ v(t_0) & \text{при } t = t_0 \end{cases}$$

полунепрерывна сверху, а функция

$$v_1(t) = \begin{cases} v(t) & \text{при } t \neq t_0 \\ u(t_0) & \text{при } t = t_0 \end{cases}$$

полунепрерывна снизу. Согласно теореме об отделении полунепрерывных функций можно найти такие непрерывные функции $y_1(t)$ и $y_2(t)$, что $u_1(t) \leq y_1(t) \leq v(t)$, а $u(t) \leq y_2(t) \leq v_1(t)$. Функции $y_1(t)$ и $y_2(t)$ требуемые.

Теорема 2. Множество V имеет единственный чебышевский центр в том и только в том случае, если $M(t)$ и $m(t)$ имеют разве лишь устранимые точки разрыва, причем в точках непрерывности разность $M(t) - m(t)$ постоянна.

{ Доказательство. Если $M(t)$ и $m(t)$ имеют неустранимые точки разрыва, то функции $n(t)$ и $N(t)$ также окажутся разрывными. Так как они полунепрерывны «с разных сторон», то

$$N(t) - n(t) \neq \text{const.}$$

То же получится, если $M(t)$ и $m(t)$ непрерывны, но

$$M(t) - m(t) \neq \text{const.}$$

Поэтому найдется точка t_0 , в которой

$$n(t_0) + r > N(t_0) - r.$$

В силу леммы 2 можно выбрать две непрерывные функции $y_1(t)$ и $y_2(t)$, для которых выполняются соотношения:

$$N(t) - r \leq y_i(t) \leq n(t) + r: (i = 1, 2); \quad \begin{cases} y_1(t_0) = n(t_0) + r \\ y_2(t_0) = N(t_0) - r. \end{cases}$$

Отсюда получается, что множество V обладает, по крайней мере, двумя чебышевскими центрами.

Обратно, если $m(t)$ и $M(t)$ имеют разве лишь устранимые точки разрыва, причем разность $M(t) - m(t)$ в точках непрерывности постоянна, то $N(t)$ и $n(t)$ непрерывны и их разность $N(t) - n(t) = 2r$. Отсюда $N(t) - r = n(t) + r$ для любого $t \in [a, b]$. Из теоремы 1 вытекает, что чебышевский центр множества V единственен.

Пример. Рассмотрим множество $V_1 = \{x_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$ функций, заданных следующим образом. При фиксированном n на каждом отрезке вида $\left[\frac{p}{2^n}, \frac{p}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}\right]$ положим

$$x_n(t) = \max \left\{ \frac{1}{2^{n+1}}, \frac{1}{g} - 2^{n+1} \left(t - \frac{p}{g} \right) \right\}; \quad \left(\frac{1}{2} \leq p \leq 2^n - 1, \frac{1}{2} \leq g \leq 2^n \right),$$

а на отрезке вида $\left[\frac{p}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}, \frac{p}{2^n}\right]$ положим

$$x_n(t) = \max \left\{ \frac{1}{2^{n+1}}, \frac{1}{g} + 2^{n+1} \left(t - \frac{p}{g} \right) \right\},$$

причем p и g изменяются в тех же пределах. В остальных точках отрезка $[0, 1]$ положим $x_n(t) = \frac{1}{2^{n+1}}$. Образуем множество $V_2 = \{y_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$, где $y_n(t) = -x_n(t) + 1$. Пусть $V = V_1 \cup V_2$. Нетрудно заметить, что

$$\begin{aligned} m(t) &= \inf_{z \in V} z(t) = \begin{cases} \frac{1}{2^n}, & \text{если } x = \frac{p}{2^n} \\ 0 & \text{в остальных точках } [0, 1] \end{cases} \\ M(t) &= \sup_{z \in V} z(t) = -m(t) + 1. \end{aligned}$$

Функция $M(t)$ полунепрерывна снизу, а $m(t)$ — сверху, причем в каждой двоично-рациональной точке интервала $(0, 1)$ эти функции имеют устранимый разрыв. Отсюда получается, что $N(t) = 1$, $n(t) = 0$, $r_V = \frac{1}{2}$, а единственным чебышевским центром множества V является функция $x = \frac{1}{2}$.

Перейдем теперь к доказательству устойчивости множества чебышевских центров. Расстояние между множествами будем понимать в смысле Хаусдорфа.

Лемма 3. Пусть V_1, V_2 — ограниченные множества пространства $C[a, b]$; $\varepsilon > 0$ — произвольное наперед заданное число. Если $\rho(V_1, V_2) \leq \varepsilon$, то для любого $t \in [a, b]$

$$|N_1(t) - N_2(t)| \leq \varepsilon, \quad |n_1(t) - n_2(t)| \leq \varepsilon \text{ и } |r_1 - r_2| \leq \varepsilon. \quad (8)$$

Доказательство. Покажем вначале, что $|M_1(t) - M_2(t)| \leq \varepsilon$ и $|m_1(t) - m_2(t)| \leq \varepsilon$ для любого $t \in [a, b]$. Фиксируя t и $\varepsilon_1 > 0$, найдем такие $x(t) \in V_1$ и $y(t) \in V_2$, для которых

$$0 \leq M_1(t) - x(t) \leq \varepsilon_1 \text{ и } -\varepsilon_1 \leq x(t) - y(t) \leq \varepsilon.$$

Тогда

$$|y_1(t_0) - s_2(t_0)| = y_1(t_0) - s_2(t_0) \leq s_1(t_0) - s_2(t_0) = |s_1(t_0) - s_2(t_0)| \leq 2\varepsilon.$$

Ввиду произвольности $\varepsilon > 0$ отсюда следует, что $\rho(T_1, T_2) \leq 2\varepsilon$. Случай, когда $\rho(y_1, T_2) = \max_t \{i_2(t) - y_1(t)\}$ доказывается аналогично.

ЛИТЕРАТУРА

1. А. Л. Гаркави. О наилучшей сети и наилучшем сечении множеств в нормированном пространстве. Изв. АН СССР, т. 26, 1962, стр. 87—106.
2. Ф. Хаусдорф. Теория множеств.ОНТИ, 1937.
3. П. К. Белобров. О чебышевской точке системы множеств. Изв. вузов, серия матем., № 6, 55, 1966.
4. И. П. Натансон. Теория функций вещественной переменной. ГИТГЛ, М., 1957.

Поступила 30 сентября 1967 г.